Mitt. Bot. München 17 p. 475 - 476 15.12.1981 ISSN 0006-8179

EINIGE NOMENKLATORISCHE ÄNDERUNGEN DER FLORA VON ALGERIEN

von

D. PODLECH

Bei der Aufarbeitung der Sammelergebnisse zweier pflanzengeographisch-ökologischer Exkursionen in die Nord- und Zentralsahara zeigte es sich, daß für eine ganze Reihe von Arten heute andere Namen gültig und anzunehmen sind, als sie in den Standardfloren von OZENDA und QUEZEL & SANTA verwendet werden. Für einige wenige Sippen stehen die gültigen Neukombinationen noch aus.

Crambe kralikii Coss.

ssp. garamas (Maire) Podlech, comb. et stat. nov.
Basion.: Cr. kralikii Coss. var. garamas Maire, Bull. Soc.
Hist. Nat. Afr. Nord 20: 14 (1929)

Diese in der Zentralsahara vorkommende einjährige Sippe ist geographisch von der mehrjährigen Typus-Sippe getrennt und weicht auch in anderen morphologischen Merkmalen von ihr ab. Eine Bewertung als Unterart ist daher gerechtfertigt.

Deverra battandieri (Maire) Podlech, comb. nov. Basion.: Pituranthos battandieri Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 9: 177 (1918)

Die Umkombination ist notwendig, da der Gattungsname Pituranthos Viv. (1824) wegen des älteren Homonyms Pituranthos Mart. (1814) illegitim ist.

Kickxia aegyptiaca (L.) Nabelek

ssp. battandieri (Maire) Podlech, comb. nov. Basion.: Linaria aegyptiaca (L.) Dum.-Cours. ssp. battandieri Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 16: 95 (1925)

ssp. fruticosa (Desf.) Podlech, comb. nov.

Basion .: Linaria fruticosa Desf., Fl. Atlant. 2: 39,

t. 133 (1798)

Die beiden in Algerien vorkommenden Unterarten der polymorphen Kickxia aegyptiaca waren bisher nur unter Linaria aegyptiaca nicht aber unter Kickxia gültig kombiniert.